

Zahlen & Fakten

Größe	Wert
Fortpflanzung	
Tragezeit	31 Tage (29 - 32)
Wurfzahl/Jahr	Wildkaninchen: 4 (2-5) Hauskaninchen: 3 (ohne künstl. Besamung)
Wurfgröße	4 (2 - 8) Junge
Geburtsgewicht	40-50 g
Säugezeit	2 - 6 Wochen
Zitzenzahl	8 (6 - 10)
Aufzucht	Jungtiere „Nesthocker“, keine „Brutpflege“ durch Alttiere
Wachstum	
Riechen	7 Tage nach der Geburt
Öffnen der Augen	8 Tage nach der Geburt
Aufnahme von festem Futter	9 Tage nach der Geburt (Nestmaterial)
Verlassen des Nestes	13 Tage nach der Geburt
Verlassen des Baus	21 Tage nach der Geburt
Amylase für Stärkeverdauung aktiv	24 Tage nach der Geburt
Entwöhnung	28 Tage nach der Geburt
Wechsel der Jugendhaare	ca. 7 Wochen nach der Geburt
Immunkompetenz	ca. 12 Wochen nach der Geburt
Geschlechtsreife	Wildkaninchen: ca. 4 Monate ¹⁾
Ausgewachsen ²⁾	Wildkaninchen: ca. 9,5 Monate
Physiologie	
Gewicht	Wildkaninchen Porto Santo ³⁾ : 741 g Wildkaninchen Deutschland ⁴⁾ : 1.543 ± 193 g Wildkaninchen Spanien, Portugal (<i>Oryctolagus cuniculus algirus</i>) ⁵⁾ : 1.043 ± 137 g Wildkaninchen Spanien, Portugal (<i>Oryctolagus cuniculus cuniculus</i>) ⁶⁾ : 1.234 ± 169 g Wildkaninchen, Sizilien ⁷⁾ : 1.240 ± 140 g Hauskaninchen: 1.000 - 10.000 g
Alter (Lebensspanne), Wildkaninchen	Mittel für alle: ≈ 2,5 Jahre Mittel älter als 1 Jahr: 3,9 (männl.), 4,2 (weibl.) ⁸⁾ Höchstalter: 7,6 Jahre (weibl.) ⁹⁾ ; 7,8 Jahre (männl.) ¹⁰⁾ ; 8,7 Jahre (weibl.) ¹¹⁾
Alter (Lebensspanne), Heimkaninchen	Median (UK): 4,3 Jahre ¹²⁾ Mittelwert (UK): 5,6 ± 0,1 ¹³⁾ Median (JP): 7 Jahre ¹⁴⁾ Höchstalter (JP): 15 Jahre (1 Tier) ¹⁵⁾
Körperlänge	Wildkaninchen: 35-45 cm
Kopflänge	Wildkaninchen: 8 cm
Schwanzlänge	Wildkaninchen: 6 cm
Ohrlänge	Wildkaninchen: 6,0-8,2 cm ¹⁶⁾

Größe	Wert
Fortpflanzung	
Anzahl der Zehen	Vorderfuß: 5 Hinterfuß: 4
Chromosomenzahl	44
Urin, pH-Wert	8,0-8,2 ¹⁷⁾
Körpertemperatur (rektal) ¹⁸⁾	Normal: 38,5-40,0°C < 38,0 nicht normal > 40,6°C fiebrige Entzündung, Hitzschlag
Herzschlag	130-325 Schläge/min ¹⁹⁾
Atemfrequenz	32-60 Atemzüge/min ²⁰⁾
Umgebungstemperatur ²¹⁾	15-20°C: optimal 20-25°C: gesteigerte Atemfrequenz > 30°C: Hecheln
Sehschärfe ²²⁾	20' (Bogenminuten) (Mensch 1'; Hund 5')
Hören (Hauskaninchen)	60 - 49.000 Hz ²³⁾ (Mensch 20 - 20.000 Hz, Hund 15 - 50.000 Hz)
Zahnwachstum	Schneidezähne: 2,0 - 4,0 mm/Woche ²⁴⁾ Backenzähne: 0,80 - 1,0 mm/Woche ²⁵⁾
Verdauungsphysiologie	
Magen, Fassungsvermögen	150-250 cm ³
Darmlänge	4,5 m (Körperlänge 45 cm) ²⁶⁾
Kotformen	1. Hartkot, geruchlos 2. Hartkot, mit Geruch der Analdrüsen 3. Blinddarmkot
Futteraufnahmezeiten, Hauskaninchen, in min/g TS/Tag ²⁷⁾	Heu = 6,52-17,84 Gras = 5,02-8,66 Mischfutter, brikettiert = 2,78-4,42 Mischfutter, pelletiert = 1,02-1,78
Kaufrequenz, Hauskaninchen, in Hz ²⁸⁾ (1 Hz=60 Kauschläge/min)	Gras = 5,00-6,30 Heu = 4,63 Löwenzahn = 4,62 Pellets = 3,96 Karotten = 3,50-4,00
Darm, Futterdurchgangszeiten, Hauskaninchen ²⁹⁾	Grünfutter: Beginn der Ausscheidung 3-4 h, Ende 4. Tag Trockenfutter: Start der Ausscheidung 4-6 h, Ende 5. Tag
Dünndarm, Faktor der Oberflächenvergrößerung ³⁰⁾³¹⁾	Kaninchen: 12-18 Hund: 8 Mensch: 5
Blinddarmkot - Aufnahme, Hauskaninchen	ab der 3. Woche; Maximum im Alter von 10 Wochen
Energiebedarf, Erhaltungsstoffwechsel ³²⁾	ca. 440 kJ DE/kg KM ^{0,75}
Energiebedarf, Laktation ³³⁾	ca. 3x Erhaltungsbedarf
Verhaltensbiologie	
max. Laufgeschwindigkeit	56 km/h ³⁴⁾ Wildkaninchen: 38 km/h ³⁵⁾

Abkürzungen:

KM = Körpermasse

$KM^{0,75}$ = metabolische Körpermasse

TS = Trockensubstanz

3 3 2599

1)

Schlolaut, W. 2003. Das große Buch vom Kaninchen. 3., erw. Aufl. Frankfurt/M. : DLG-Verlag, 2003. ISBN 3-7690-0592-9

2)

Watson, J. S. 1957. Reproduction of the wild rabbit, *Oryctolagus cuniculus* (L.) in Hawke's Bay, New Zealand. N. Z. Journal of Science and Technology. 1957, S. 451-482

3)

Flux, J. E. C. und Fullagar, P. J. 1992. World distribution of the rabbit (*Oryctolagus cuniculus*) on islands. Mammal Review. 1992, 22, S. 151-205

4)

Kaetzke, J., Niedermeier, J. und Masseti, M. 2003. Europäisches Wildkaninchen. In: Krapp, F. & Niethammer, J. Handbuch der Säugetiere Europas. Hasenartige. Bd. 3/II Wiesbaden : Akad. Verl.-Ges. ISBN 3891045093

5) 6)

Ferreira, C. C., Castro, F., Piorno, V., Barrio, I. C., Delibes-Mateos, M., Rouco, C., ... & Villafuerte, R. 2015. Biometrical analysis reveals major differences between the two subspecies of the European rabbit. Biological Journal of the Linnean Society, 116(1), 106-116

7)

Lo Valvo, M., La Scala, A., & Scalisi, M. 2014. Biometric characterisation and taxonomic considerations of European rabbit *Oryctolagus cuniculus* (Linnaeus 1758) in Sicily (Italy). World Rabbit Science, 22(3), 207-214

8)

von Holst, D., et al. 1999. Social Rank, Stress, Fitness, and Life Expectancy in Wild Rabbits. Naturwissenschaften, 86, S. 388-393

9)

Peacock, D. E. und Sinclair, R. G. 2009. Longevity record for a wild European rabbit (*Oryctolagus cuniculus*) from South Australia. Australian Mammalogy. 2009, Bd. 31, 1, S. 65-66

10)

Rödel, H. G., von Holst, D. und Kraus, C. 2009. Family legacies: short- and long-term fitness consequences of early-life conditions in female European rabbits. Journal of Animal Ecology. 2009, 78, S. 789-797

11)

Rödel, pers. Mitteilung

12)

O'Neill, D. G., Craven, H. C., Brodbelt, D. C., Church, D. B., & Hedley, J. 2020. Morbidity and mortality of domestic rabbits (*Oryctolagus cuniculus*) under primary veterinary care in England. Veterinary Record, 186(14), 451-451

13)

Rooney, N. J., Blackwell, E. J., Mullan, S. M., Saunders, R., Baker, P. E., Hill, J. M., ... & Held, S. D. (2014). The current state of welfare, housing and husbandry of the English pet rabbit population. BMC research notes, 7(1), 942. <http://www.biomedcentral.com/1756-0500/7/942>

14) 15)

Shiga, T., Nakata, M., Miwa, Y., Kikuta, F., Sasaki, N., Morino, T., & Nakayama, H. 2022. Age at death and cause of death of pet rabbits (*Oryctolagus cuniculus*) seen at an exotic animal clinic in Tokyo,

Japan: a retrospective study of 898 cases (2006–2020). *Journal of Exotic Pet Medicine*, 43, 35-39.

<https://doi.org/10.1053/j.jepm.2022.09.003>

16)

Niethammer, J. Krapp, F. 2003. *Handbuch der Säugetiere Europas. Hasenartige*. 1. Auflage. Akad. Verl.-Ges.; Wiesbaden. ISBN 978-3-89104-509-1

17) 18) 19) 20)

Varga, M. 2016. *Textbook of Rabbit Medicine*. 2nd Edition. s.l. : Butterworth-Heinemann, Elsevier, 2014. ISBN 978-0-7020-4979-8

21)

Nichelmann, M. 1984. Warum Kaninchen bei Hitze hecheln. *GuK*. 1984, 14, S. 8-9

22)

Peichl, L. 1997. *Die Augen der Säugetiere: Unterschiedliche Blicke in die Welt. Biologie in unserer Zeit*. 1997, Bd. 27, 2, S. 96-105

23)

Heffner, H., & Masterton, B. 1980. Hearing in glires: domestic rabbit, cotton rat, feral house mouse, and kangaroo rat. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 68(6), 1584-1599

24)

Bucher, L. 1994. *Fütterungsbedingte Einflüsse auf Wachstum und Abrieb von Schneidezähnen bei Zwergkaninchen*. Berlin : Freie Universität, 1994. Dissertation

25)

Jekl, V. und Redrobe, S. 2013. Rabbit dental disease and calcium metabolism – the science behind divided opinions. *Journal of Small Animal Practice*. 2013, 54, S. 481-490

26)

Van Soest, P. J. 1982. *Nutritional Ecology of the Ruminant*. Corvallis, Oregon: O and B Books Inc

27)

Wenger, A. 1997. *Vergleichende Untersuchungen zur Aufnahme und Verdaulichkeit verschiedener rohfaserreicher Rationen und Futtermittel bei Zwergkaninchen, Meerschweinchen und Chinchilla*. [Hrsg.] Tierärztl. Hochsch. Hannover 1997. Diss.

28)

Hörnigke, H. 1978. Futteraufnahme beim Kaninchen: Ablauf und Regulation. *Übersichten zur Tierernährung*. 1978, 6, S. 91-148

29)

Mangold, E. 1951. Die Futter-Durchgangszeiten beim Kaninchen. *Archiv für Tierernährung*. 1951b, Bd. Vol 1, Issue 1-6, S. 136-147

30)

Mangold, E. 1951. Darmlänge, Durchgangszeit und Durchgangsgeschwindigkeit. *Sitzungsberichte d. Deutschen Akademie der medizinischen Wissenschaften zu Berlin. Klasse für medizinische Wissenschaften* Jhrg. 1950 Nr. III. Berlin : Akademie-Verlag Berlin, 1951a, S. 1-31

31)

Langenbeck, A. 1996. Fassungsvermögen und innere Oberfläche des Darms von Weißzahnschnecken (Mammalia: Crocidurinae) unterschiedlicher Körpergröße. *Bonn. zool. Beitr.* Bd. 46. H. 1-4. S. 287-305

32) 33)

Kamphues, J.; Wolf, P.; Coenen, M.; Eder, K.; Iben, C.; Kienzle, E.; Liesegang, A.; Männer, K.; Zebeli, Q.; Zentek, J. 2014. *Supplemente zu Vorlesungen und Übungen in der Tierernährung*. 12. Aufl. Hannover : M. & H. Schaper. ISBN 978-3-7944-0240-3

34)

Garland, T. 1983. The relation between maximal running speed and body mass in terrestrial mammals. *Journal of Zoology*, 199(2), 157-170.

35)

Niethammer, G. 1937. Ergebnisse von Markierungsversuchen an Wildkaninchen. *Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere*, Vol. 33, No. 2 (3. AUGUST 1937), pp. 297-312

From:

<http://wikikanin.de/> - **Wikikanin**

Permanent link:

<http://wikikanin.de/doku.php?id=zahlen&rev=1766255439>

Last update: **2025/12/20 19:30**

