# Haarstruktur - Satin

Assoziiertes Gen:

Chromosom:

Vererbung: monogen; rezessiv (sa)

---

**Symbol:** sa

**Phänotyp:** Seidiges, glänzendes Haar mit erhöhter Sichtbarkeit der Haarpigmente (sofern vorhanden) aufgrund veränderter Struktur des Haarschafts.

## Geschichte

Der Satinfaktor trat erstmals um 1930 in Pendleton (Nordamerika) bei ingezüchteten Havannakaninchen auf.[1)2)](S. 119)

In Deutschland werden Satinkaninchen, im Gewichtsrahmen der mittelgroßen Rassen, seit etwa 1973 gezüchtet.[3)](S. 97-98) Ende 1977 folgte ihre Aufnahme in den Standard.[4)]

### Zur Vererbung

Castle & Law, 1936[5)] beschrieben einen einfachen rezessiven Erbgang; es konnte keine Kopplung mit anderen, damals bekannten Genen festgestellt werden (*albinism, brown, extension, agouti, English, angora, furless, rex 1/2, rex3*).

## Phänotypen (Beispiele)

| | |
|---|---|
| **Satinhaar** |  Abb. 1: Satin luxfarbig ©KH |
| |  Abb. 2: Zwergwidder-Satin gelb ©KH |

1 1 1048

[1)] [5)]
Castle, W. E., & Law, L. W. 1936. Satin, a new hair mutation of the rabbit. J. Hered. 27, 235-240.
[2)]
Nachtsheim, H., & Stengel, H. 1977. Vom Wildtier zum Haustier. 3. Auflage. Berlin, Hamburg: Paul Parey. ISBN 3-489- 60636-1.
[3)]
Niehaus, H. 1987. Unsere Kaninchenrassen. Band II: Rassebeschreibungen. Reutlingen: Oertel + Spörer. ISBN: 3-88627-054-8.
[4)]
Weißenberger, K. (1994). Kaninchenrassen – Rassebeschreibungen mit Erbformeln. 3. überarb. und ergänzte Auflage. Landbuch-Verlag GmbH, Hannover. ISBN 3 7842 1321 9.

From:
https://wikikanin.de/ - **Wikikanin**

Permanent link:
**https://wikikanin.de/doku.php?id=genetik:haarstruktur_satin&rev=1789625503**

Last update: **2026/09/17 08:11**