Zahlen & Fakten

Größe	Wert
Fortpflanzung	
Tragezeit	31 Tage (29 - 32)
Wurfzahl/Jahr	Wildkaninchen: 4 (2-5) Hauskaninchen: 3 (ohne künstl. Besamung)
Wurfgröße	4 (2 - 8) Junge
Geburtsgewicht	40-50 g
Säugezeit	2 - 6 Wochen
Zitzenzahl	8 (6 - 10)
Aufzucht	Jungtiere „Nesthocker“, keine „Brutpflege“ durch Alttiere
Wachstum	
Riechen	7 Tage nach der Geburt
Öffnen der Augen	8 Tage nach der Geburt
Aufnahme von festem Futter	9 Tage nach der Geburt (Nestmaterial)
Verlassen des Nestes	13 Tage nach der Geburt
Verlassen des Baus	21 Tage nach der Geburt
Amylase für Stärkeverdauung aktiv	24 Tage nach der Geburt
Entwöhnung	28 Tage nach der Geburt
Wechsel der Jugendhaare	ca. 7 Wochen nach der Geburt
Immunkompetenz	ca. 12 Wochen nach der Geburt
Geschlechtsreife	Wildkaninchen: ca. 4 Monate[1)]
Ausgewachsen[2)]	Wildkaninchen: ca. 9,5 Monate
Physiologie	
Gewicht	Wildkaninchen Porto Santo[3)]: 741 g Wildkaninchen Deutschland[4)]: 1.543 ± 193 g Wildkaninchen Spanien, Portugal (*Oryctolagus cuniculus algirus*)[5)]: 1.043 ± 137 g Wildkaninchen Spanien, Portugal (*Oryctolagus cuniculus cuniculus*)[6)]: 1.234 ± 169 g Wildkaninchen, Sizilien[7)]: 1.240 ± 140 g Hauskaninchen: 1.000 - 10.000 g
Alter (Lebensspanne), Wildkaninchen	Mittel für alle: ≈ 2,5 Jahre Mittel älter als 1 Jahr: 3,9 (männl.), 4,2 (weibl.)[8)] Höchstalter: 7,6 Jahre (weibl.)[9)]; 7,8 Jahre (männl.)[10)]; 8,7 Jahre (weibl.)[11)]
Alter (Lebensspanne), Heimkaninchen	Median (UK): 4,3 Jahre[12)] Mittelwert (UK): 5,6 ± 0,1[13)] Median (JP): 7 Jahre[14)] Höchstalter (JP): 15 Jahre (1 Tier)[15)]
Körperlänge	Wildkaninchen: 35-45 cm
Kopflänge	Wildkaninchen: 8 cm
Schwanzlänge	Wildkaninchen: 6 cm
Ohrlänge	Wildkaninchen: 6,0-8,2 cm[16)]
Wirbelformel	Wildkaninchen Finnland: C7/T12/L7/S4[17)]

Größe	Wert
Fortpflanzung	
Anzahl der Zehen	Vorderfuß: 5 Hinterfuß: 4
Chromosomenzahl	44
Urin, pH-Wert	8,0-8,2[18)]
Körpertemperatur (rektal)[19)]	Normal: 38,5-40,0°C < 38,0 nicht normal > 40,6°C fiebrige Entzündung, Hitzschlag
Herzschlag	130-325 Schläge/min[20)]
Atemfrequenz	32-60 Atemzüge/min[21)]
Umgebungstemperatur[22)]	15-20°C: optimal 20-25°C: gesteigerte Atemfrequenz > 30°C: Hecheln
Sehschärfe[23)]	20' (Bogenminuten) (Mensch 1'; Hund 5')
Hören (Hauskaninchen)	60 - 49.000 Hz[24)] (Mensch 20 - 20.000 Hz, Hund 15 - 50.000 Hz)
Zahnwachstum	Schneidezähne: 2,0 - 4,0 mm/Woche[25)] Backenzähne: 0,80 - 1,0 mm/Woche[26)]
Verdauungsphysiologie	
Magen, Fassungsvermögen	150-250 cm^3
Darmlänge	4,5 m (Körperlänge 45 cm)[27)]
Kotformen	1. Hartkot, geruchlos 2. Hartkot, mit Geruch der Analdrüsen 3. Blinddarmkot
Futteraufnahmezeiten, Hauskaninchen, in min/g TS/Tag[28)]	Heu = 6,52-17,84 Gras = 5,02-8,66 Mischfutter, brikettiert = 2,78-4,42 Mischfutter, pelletiert = 1,02-1,78
Kaufrequenz, Hauskaninchen, in Hz[29)] (1 Hz=60 Kauschläge/min)	Gras = 5,00-6,30 Heu = 4,63 Löwenzahn = 4,62 Pellets = 3,96 Karotten = 3,50-4,00
Darm, Futterdurchgangszeiten, Hauskaninchen[30)]	Grünfutter: Beginn der Ausscheidung 3-4 h, Ende 4. Tag Trockenfutter: Start der Ausscheidung 4-6 h, Ende 5. Tag
Dünndarm, Faktor der Oberflächenvergrößerung[31)32)]	Kaninchen: 12-18 Hund: 8 Mensch: 5
Blinddarmkot - Aufnahme, Hauskaninchen	ab der 3. Woche; Maximum im Alter von 10 Wochen
Energiebedarf, Erhaltungsstoffwechsel[33)]	ca. 440 kJ DE/kg $KM^{0,75}$
Energiebedarf, Laktation[34)]	ca. 3x Erhaltungsbedarf
Verhaltensbiologie	
max. Laufgeschwindigkeit	56 km/h[35)] Wildkaninchen: 38 km/h[36)]

Abkürzungen:
KM = Körpermasse
$KM^{0,75}$ = metabolische Körpermasse
TS = Trockensubstanz

---

1 1 3002

1)
Schlolaut, W. 2003. Das große Buch vom Kaninchen. 3., erw. Aufl. Frankfurt/M. : DLG-Verlag, 2003. ISBN 3-7690-0592-9
2)
Watson, J. S. 1957. Reproduction of the wild rabbit, Oryctolagus cuniculus (L.) in Hawke's Bay, New Zealand. N. Z. Journal of Science and Technology. 1957, S. 451-482
3)
Flux, J. E. C. und Fullagar, P. J. 1992. World distribution of the rabbit (Oryctolagus cuniculus) on islands. Mammal Review. 1992, 22, S. 151–205
4)
Kaetzke, J., Niedermeier, J. und Masseti, M. 2003. Europäisches Wildkaninchen. In: Krapp, F. & Niethammer, J. Handbuch der Säugetiere Europas. Hasenartige. Bd. 3/II Wiesbaden : Akad. Verl.-Ges. ISBN 3891045093
5) , 6)
Ferreira, C. C., Castro, F., Piorno, V., Barrio, I. C., Delibes-Mateos, M., Rouco, C., ... & Villafuerte, R. 2015. Biometrical analysis reveals major differences between the two subspecies of the European rabbit. Biological Journal of the Linnean Society, 116(1), 106-116
7)
Lo Valvo, M., La Scala, A., & Scalisi, M. 2014. Biometric characterisation and taxonomic considerations of European rabbit Oryctolagus cuniculus (Linnaeus 1758) in Sicily (Italy). World Rabbit Science, 22(3), 207-214
8)
von Holst, D., et al. 1999. Social Rank, Stress, Fitness, and Life Expectancy in Wild Rabbits. Naturwissenschaften, 86, S. 388–393
9)
Peacock, D. E. und Sinclair, R. G. 2009. Longevity record for a wild European rabbit (Oryctolagus cuniculus) from South Australia. Australian Mammalogy. 2009, Bd. 31, 1, S. 65-66
10)
Rödel, H. G., von Holst, D. und Kraus, C. 2009. Family legacies: short- and long-term fitness consequences of early-life conditions in female European rabbits. Journal of Animal Ecology. 2009, 78, S. 789-797
11)
Rödel, pers. Mitteilung
12)
O'Neill, D. G., Craven, H. C., Brodbelt, D. C., Church, D. B., & Hedley, J. 2020. Morbidity and mortality of domestic rabbits (Oryctolagus cuniculus) under primary veterinary care in England. Veterinary Record, 186(14), 451-451
13)
Rooney, N. J., Blackwell, E. J., Mullan, S. M., Saunders, R., Baker, P. E., Hill, J. M., ... & Held, S. D. (2014). The current state of welfare, housing and husbandry of the English pet rabbit population. BMC research notes, 7(1), 942. http://www.biomedcentral.com/1756-0500/7/942
14) , 15)
Shiga, T., Nakata, M., Miwa, Y., Kikuta, F., Sasaki, N., Morino, T., & Nakayama, H. 2022. Age at death and cause of death of pet rabbits (Oryctolagus cuniculus) seen at an exotic animal clinic in Tokyo,

Japan: a retrospective study of 898 cases (2006–2020). Journal of Exotic Pet Medicine, 43, 35-39. https://doi.org/10.1053/j.jepm.2022.09.003
16)

Niethammer, J. Krapp, F. 2003. Handbuch der Säugetiere Europas. Hasenartige. 1. Auflage. Akad. Verl.-Ges.; Wiesbaden. ISBN 978-3-89104-509-1
17)

Reunanen, V., Jormakka, N., & Mäkitaipale, J. (2026). Dental and skeletal findings of 140 wild rabbits (Oryctolagus cuniculus) in Finland 2010–2015. Acta Veterinaria Scandinavica, 68, 13.
18) , 19) , 20) , 21)

Varga, M. 2016. Textbook of Rabbit Medicine. 2nd Edition. s.l. : Butterworth-Heinemann, Elsevier, 2014. ISBN 978-0-7020-4979-8
22)

Nichelmann, M. 1984. Warum Kaninchen bei Hitze hecheln. GuK. 1984, 14, S. 8-9
23)

Peichl, L. 1997. Die Augen der Säugetiere: Unterschiedliche Blicke in die Welt. Biologie in unserer Zeit. 1997, Bd. 27, 2, S. 96-105
24)

Heffner, H., & Masterton, B. 1980. Hearing in glires: domestic rabbit, cotton rat, feral house mouse, and kangaroo rat. The Journal of the Acoustical Society of America, 68(6), 1584-1599
25)

Bucher, L. 1994. Fütterungsbedingte Einflüsse auf Wachstum und Abrieb von Schneidezähnen bei Zwergkaninchen. Berlin : Freie Universität, 1994. Dissertation
26)

Jekl, V. und Redrobe, S. 2013. Rabbit dental disease and calcium metabolism – the science behind divided opinions. Journal of Small Animal Practice. 2013, 54, S. 481–490
27)

Van Soest, P. J. 1982. Nutritional Ecology of the Ruminant. Corvallis, Oregon: 0 and B Books Inc
28)

Wenger, A. 1997. Vergleichende Untersuchungen zur Aufnahme und Verdaulichkeit verschiedener rohfaserreicher Rationen und Futtermittel bei Zwergkaninchen, Meerschweinchen und Chinchilla. [Hrsg.] Tierärztl. Hochsch. Hannover 1997. Diss.
29)

Hörnicke, H. 1978. Futteraufnahme beim Kaninchen: Ablauf und Regulation. Übersichten zur Tierernährung. 1978, 6, S. 91-148
30)

Mangold, E. 1951. Die Futter-Durchgangszeiten beim Kaninchen. Archiv für Tierernährung. 1951b, Bd. Vol 1, Issue 1-6, S. 136-147
31)

Mangold, E. 1951. Darmlänge, Durchgangszeit und Durchgangsgeschwindigkeit. Sitzungsberichte d. Deutschen Akademie der medizinischen Wissenschaften zu Berlin. Klasse für medizinische Wissenschaften Jhrg. 1950 Nr. III. Berlin : Akademie-Verlag Berlin, 1951a, S. 1-31
32)

Langenbeck, A. 1996. Fassungsvermögen und innere Oberfläche des Darms von Weißzahnspitzmäusen (Mammalia: Crocidurinae) unterschiedlicher Körpergröße. Bonn. zool. Beitr. Bd. 46. H. 1-4. S. 287-305
33) , 34)

Kamphues, J.; Wolf, P.; Coenen, M.; Eder, K.; Iben, C.; Kienzle, E.; Liesegang, A.; Männer, K.; Zebeli, Q.; Zentek, J. 2014. Supplemente zu Vorlesungen und Übungen in der Tierernährung. 12. Aufl. Hannover : M. & H. Schaper. ISBN 978-3-7944-0240-3
35)

Garland, T. 1983. The relation between maximal running speed and body mass in terrestrial mammals. Journal of Zoology, 199(2), 157-170.
36)

Niethammer, G. 1937. Ergebnisse von Markierungsversuchen an Wildkaninchen. Zeitschrift für

Morphologie und Ökologie der Tiere, Vol. 33, No. 2 (3. AUGUST 1937), pp. 297-312

From:
https://wikikanin.de/ - **Wikikanin**

Permanent link:
https://wikikanin.de/doku.php?id=zahlen&rev=1772116738

Last update: **2026/02/26 15:38**